ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΣΜΩΝ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ.. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Άμφισσα .....199.....

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Θέμα: Εκδήλωσ ενδιαφέροντος για αναγνώριση προστατευομένης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Α Ι Τ Η Σ Η

Β)

Της Ενωσης Αγροτικών Συν/σμών Αμφισσας με έδρα την Αμφισσα όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης της βρώσιμης ελιάς Αμφίσσης.

Αιτούμεθα την αναγνώριση Ονομασίας Προέλευσης με την επωνυμία Βρώσιμη Ελιά Αμφίσσης η οποία συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας.

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Η γεωγραφική ζώνη προέλευσης της βρώσιμης ελιάς Αμφίσσης περιλαμβάνει τους Δήμους Αμφίσσης, Ιτέας, Δελφών, και τις Κοινότητες Χρισσού, Σερνικακίου, Αγίου Κων/νου, Αγίου Γεωργίου, Ελαιώνα, Δροσοχωρίου, Προσηλίου και Κίρρας στις οποίες υπάρχουν περίπου 800.000 ελαιόδενδρα.

Η ανωτέρω περιοχή περιλαμβάνεται και ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 417/3.9.85 Τ4 Υ περί καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου..... περιοχή Δελφών Νομού Φωκίδος και Νομού Βοιωτίας ".

Ο ακριβής καθορισμός της γεωγραφικής ζώνης προέλευσης της βρώσιμης ελιάς Αμφίσσης καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 259/25.4.1991 περί " Καθορισμού ζωνών προστασίας αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου (επισυνάπτονται οι σχετικοί χάρτες).

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΣΜΩΝ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ.. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Ἀμφισσα ..... 199.....

Η τυποποίηση και συσκευασία του ελαιοκάρπου γίνεται εντός των ορίων της ζώνης προέλευσης. Παρατίθεται κατάσταση των Κονσερβοποιείων βρώσιμης ελιάς Αμφίσσης:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΕΔΡΑ
1) ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2) Λιανουλόπουλος Αλέξανδρος (ALEX)	ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ
3) Γάτος (GATOLIVE)	Χρισσό
4) Σπάτουλας (SPATOLIVE)	ΙΤΕΑΣ
5) Αναγνωστάκος (ANOLIVE)	ΙΤΕΑΣ
6) Κουτρόγιαννος (ELKO)	ΙΤΕΑΣ
7) Μοσκαχλαιδής (KRINOS)	ΙΤΕΑΣ
8) Μπρούζος (ARISTON FOKAS)	ΙΤΕΑΣ
9) Μπραούζος (M.B.)	ΙΤΕΑΣ
10) Λύτρας (FOKIS)	ΙΤΕΑΣ
11) Καβούνης (PANOLIVE)	ΚΙΡΡΑ
12) Καραλίβανος (KAROLIVE)	ΙΤΕΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Άμφισσα ..... 199 .....

Δ. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

Η καλλιεργούμενη ποικιλία είναι η ονομαστή 'Κονσερβοελιά Αμφίσσης'
(OLEA EUROPAEA MEDIA ROTUNDA) . Στον παραδοσιακό έλαιώνα της Αμφίσσης'
τα δέντρα είναι μεγάλης ηλικίας και αναπτύσσονται από την στάθμη της θάλασσας
έως υψόμετρο 500 μέτρα. Είναι ποικιλία μεσόκαρπη έως αδρόκαρπη .
Είναι ποικιλία μεσόκαρπη έως αδρόκαρπη και μέση απόδοση 20 κιλά κατά
δένδρο το χρόνο. Το βάρος του καρπού κυμαίνεται από 5 έως 8 Γραμμάρια.
Το μέγεθος του καρπού έχει μήκος 20-30 εκατοστά και πάχος 2-2,5 εκατοστά
Κατά συνέπεια το σχήμα είναι στρογγυλό έως ωοειδές ενώ το βάρος του
πυρήνα είναι 12-13% του συνόλου .
Μορφολογικά ανήκει στους μικροπύρηνες ποικιλίες αφού η σχέση σάρκα /
πυρήνα κυμαίνεται από 8 έως 10 : 1

Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος του
ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμοποιουνται για την περιγραφή του προϊόντος
είναι:

Εμπορική ονομασία	Αριθμός καρπών ανα κιλό
SUPER MAMMOUTH	91-100
MAMMOUTH	101-110
SUPER COLOSSAL	111-120
COLOSSAL	121-140
GIANTS	141-160
EXTRA JUMBO	161-180
JUMBO	181-200
EXTRA LARGE	201-230
LARGE	231-260
SUPERIOR	261-290

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΣΜΩΝ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

Άμφισσα ..... 199 .....

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Ε.ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η καλλιέργεια γίνεται σε πεδινές και ημι-ορεινές περιοχές της ζώνης

1.Αρδευση: Το 80 % του πεδινού μέρους του ελαιώνα αρδεύεται με τα όμβρια νερά των χειμάρων με χειμερινή και εαρινή κατάκληση.
Μόνον ένα μικρό ποσοστό 20% αρδεύεται με θερινές αρδεύσεις από ύδατα γεωτρήσεων κυρίως στην κατώτερη λεκάνη απορροής του ελαιώνα
Τα ελαιόδενδρα στους λόφους των παρειών του ελαιώνα δέχονται μόνο τα ύδατα των βροχοπτώσεων.

2.Ζιζανιοκτονία: Γίνεται βασικά με φρεζαρίσματα κά την άνοιξη και το Φθινόπωρο πριν την συγκομιδή.

3.Λίπανση: Ο ελαιώνας δέχεται τις παρακάτω λιπάνσεις:
-Αζωτοίχος: 1-1,5 μονάδα/δένδρο/διετία με ζωτούχο λίπασμα.
-Μέχρι μια μονάδα καλίου σε ορισμένα επικλινή εδάφη με μορφή θειικού καλίου

4.Καταπολέμηση δάκου: Η κυριότερη εντομολογική προσβολή είναι ο δάκος της ελιάς (DACUS OLEAE και η καταπολέμηση θα γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους και με βιολογικές μεθόδους ,με πρωτιοβουλία της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

5.Συγκομιδή: Η συγκομιδή του καρπού πραγματοποιείται με τα χέρια ή με ραβδισμό από το δένδρο ή με δονιστικά μηχανήματα (σε μικρή έκταση)

ΣΤ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Μετά την συγκομιδή της ελιάς από τους παραγωγούς στο στάδιο της ωρίμανσης (με το πέρας αυτής)αποθηκεύεται στις δεξαμενές και διατηρείται σε διάλυμα φυσικού άλατος (χλωριούχου νατρίου) περιεκτικότητες 7 με 11% όπου παραμένει για διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για την φυσική εκπίκρυνση που γίνεται με φυσική ζύμωση στο περιβάλλον αυτό
Το προϊόν συσκευάζεται από τη Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Αμφισσας στις εγκαταστάσεις της σε διάφορες εμπορικές συσκευασίες και διατηρείται σε διάλυμα φυσικού άλατρς περιεκτικότητας 7 με 9 % στην συσκευασια.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ.. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

Άμφισσα ..... 199 .....

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Ζ)ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Η Γεωγραφική θέση της Κοιλάδας της Αμφισσας και η γεομορφολογία της γύρω περιοχής διαμορφώνουν ένα κλιματικό τύπο με χαρακτηριστικάκατά βάση του χερσαίου Μεσογειακού τύπου , με επιδράσεις όμως από το θαλάσσιο Μεσογειακό λόγω γειτονίας με την θάλασσα του Κορινθιακού.

- Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18^{O} C.
- Το Ετήσιο μέσο θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται μεταξύ 16- 18^{O} C
- Το ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται στα 500 - 600 χιλιοστά.
- Ο ετήσιος αριθμός των αιθρίων ημερών υπερβαίνει τις 100 ημέρες.

Τα εδάφη της κοιλάδας της Αμφισσας είναι αλλουβιακά που το μητρικό τους πέτρωμα έχει μεταφερθεί με το νερό.
Από άποψη μηχανικής σύστασης τα εδάφη είναι πηλώδη, αμμοπηλώδη και αργιλώδη

Η) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Ο συνδιασμός των εδαφοκλιματικών συνθηκών της κοιλάδας της Αμφισσας της καλλιεργούμενης ποικιλίας 'Κονερβοελιά Αμφίσσης ΄και των καλλιεργητικών φροντίδων των παραγωγών ανέδειξαν στην πορεία των δύο τελευταίων αιώνων (επισυνάπτονται ιστορικά στοχεία) της εξαιρετικής ποιότητας βρώσιμης ελιάς Αμφίσσης στρις εγχώριες και στις αγορές του εξωτερικού

Η σάρκα του καρπού είναι συμπαγής περιέχουσα 20-25% λιπαρές και 2-3% ζυμώσιμα συστατικά επί νωπής βάσεως Το χρωμα της επιδερμίδας αλλάζει σταδιακά από πρασινο σε ρόδινο , ερυθροιώδες , ιώδες και τελικά σε βαθύ μαύρο κατά το στάδιο της υπερωριμάνσεως .
Μετά την ζύμωση όταν ο καρπός διατίθεται προς κατανάλωση το χρωμα είναι από βυσσινύ μέχρι μαύρο.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α Σ
ΣΥΝ. Π. Ε.

Δ)νση : Τηλ. 28 235
Λογ)ριο : » 22 497
Κονσερβ. : » 28 097
Πρατ. Γ. Εφοδίων : » 29 651
TELEX : 299627

Άμφισσα 199

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....

Αριθ. Πρωτ. .....

Θ.ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Η ελιά τελικό προιόν έχει χρώμα από βυσσινη μέχρι μαύρο.

Για την ΕΑΣ Αμφισσας
Ο ΔΑΝΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ