Α Ι Τ Η Σ Η Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Σ

"ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ"

ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

2. - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

3. - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΛΑΙΩΝ

4. - ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΑΙΩΝ

5. - ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

6. - ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

7. - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΩΝ

Α. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΛΟΚΡΙΔΑΣ-ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ : (0233) 22.227-22.636
- FAX : (0233) 22.127
- ΑΡ.ΦΥΣ.ΜΕΛΩΝ : 7.540
- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ : 1939
- Α.Φ.Μ. : 96005181

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΤΕΤΑΙ [illegible]

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Γ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ

ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 20.000 ΤΟΝ.

Δ. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ" ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 128.220 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΝΟΥΝ 2.082.000 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ.

Α/Α	ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
1.	ΑΤΑΛΑΝΤΗ	27.000	420.000
2.	ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ	16.000	270.000
3.	ΑΡΚΙΤΣΑ	6.500	110.000
4.	ΑΓΝΑΝΤΗ	350	6.000
5.	ΕΛΑΤΕΙΑ	1.250	24.000
6.	ΕΞΑΡΧΟΣ	300	5.000
7.	ΖΕΛΙ	470	9.000
8.	ΚΑΛΑΠΟΔΙ	4.000	60.000
9.	ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ	2.250	35.000
10.	ΚΟΛΑΚΑ	450	8.000
11.	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	1.600	24.000
12.	ΛΑΡΥΜΝΑ	3.600	57.000
13.	ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ	11.500	208.000
14.	ΜΑΛΕΣΣΙΝΑ	30.800	490.000
15.	ΜΑΡΤΙΝΟ	7.000	87.000
16.	Μ.ΠΛΑΤΑΝΟΣ	12.600	220.000
17.	ΠΡΟΣΚΥΝΑ	500	9.000
18.	ΣΦΑΚΑ	450	8.000
19.	ΤΡΑΓΑΝΑ	1.600	32.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		128.220	2.082.000

Ε. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΠΙΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥ ΧΕΙΜΩΝΑ,ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ Η''ΜΕΤΡΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ,ΑΝΙΣΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΩΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΥΤΟΦΥΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	:	17.5 C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	:	65-75 %
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ	:	450 mm/ετος
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ	:	220 ωρες/μηνα

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΠΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΕΙΝΑΙ "ΕΡΥΘΡΑ" ΠΗΛΟΑΜΜΩΔΗ ΜΕ ΡΗ 7,5 ΕΩΣ 8.2 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ.

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

- ΜΕΧΡΙ ΜΙΑ (1) ΜΟΝΑΔΑ ΑΖΩΤΟΥ ΑΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΤΟΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΘΕΙΙΚΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ.
- ΜΕΧΡΙ 0,5 ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ
- ΜΕΧΡΙ ΜΙΑ (1) ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΙΟΥ ΣΕ ΞΗΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, Η" ΜΕ 0,7 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΙΟΥ ΣΕ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ.
- ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΒΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΟΡΑΚΑ.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΦΕΡΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ,ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 300-400 ΚΙΛΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΩΣ (5) ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ,ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ Η" ΣΤΑΓΔΗΝ.

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΟΛΩ-
-ΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ.

Ζ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΩΝ ,ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ.

ΤΟ ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΤΑ (7) ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ Η ΔΕ ΣΧΕΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΠΟ ΕΙΝΑΙ 6:1

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΩΝ.

Η ΕΚΠΙΚΡΑΝΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ($NaCl$) ΟΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΠΟΛΥ,ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟ--ΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ ΟΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΑΧΥΤΑΤΑ Η ΕΚΠΙΚΡΑΝΣΗ.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΛΜΗΣ 7-9% ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΕΙΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΖΑ Η" ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 3, 5, 13, 50, ΚΑΙ 130 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΓΕΥΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ,ΣΑΡΚΑ ΤΡΑΓΑΝΗ,ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕΧΡΙ ΜΕΛΑΝΟΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
SUPER MAMOUTH	91-100
MAMOUTH	101-110
SUPER COLOSSAL	111-120
COLOSSAL	121-140
GIANTS	141-160
EXTRA JUMBO	161-180
JUMBO	181-200
EXTRA LARGE	201-230
LARGE	231-260
SUPERIOR	261-290
BRILLIANTS	291-320
FINE	321-350
BULLETS	351-380

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΜΟΣ

Π.Ο.Π. "Κονσερβολιά Αταλάντης"

olive A.O.P. Konservolia Atalantis

