ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ" ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ρόδος 21 Ιουνίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Δ) ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Ε) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΣΤ) ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ζ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

- ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ & ΚΩ

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

- Επωνυμία:Ε.Α.Σ. ΔΩΔ/ΣΟΥ Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΠΕΡ - 1 , 851 00 ΡΟΔΟΣ
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ :0241/28374-75-76-28562 και 0241/24159
- FAX :0241/27409
- TELEX :292106
- Νομική Μορφή Ε.Α.Σ. ΔΩΔ/ΣΟΥ:Συν/σμός Περιορισμένης Ευθύνης
- Αριθμός Φυσικών Μελών Οργάνωσης: 16.158
  (υπάγονται όλοι οι Ελαιοκαλλιεργητές τού Ν. Δωδεκανήσου).
- Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου ΕΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:Η Οργάνωση αναγνωρίσθηκε τό έτος 1986 (Α.Π. 7400/24. 11. 1986) έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας τού Νομού Δωδεκανήσου.

Β)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

-Γεωγραφικό Ονομα : ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ ← ΟΧΙ

← Νά γίνει αναθεώρηση

Ολες οι Ελαιοκομικές περιοχές Νήσου ΚΩ καθώς επίσης και Νήσου Ρόδου μέ εξαίρεση Ελαιοκομικών περιοχών τών κοινοτήτων(ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΑΛΩΝΑΣ, ΜΑΣΣΑΡΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΥ, και ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ)στίς οποίες παρενθετικά αναφέρουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες από τά επόμενα χρόνια νά γίνεται η καταπολέμηση τού Δάκου από εδάφους.

%

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Τη Γεωγραφική ζώνη προέλευσης και μεταποίησης του ελαιοκάρπου αποτελούν τα διοικητικά όρια του Νομού Δωδεκανήσου (συνημμένα χάρτης Ρόδου-Κω).

Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην εν λόγω γεωγραφική ζώνη τη τελευταία 8ετία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. ΡΟΔΟΥ (τόννοι)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (τόννοι)	%	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΩ (τόννοι)	%	ΥΠΟΛΟΙ ΝΟΜΟΥ
85-86	5356	4419	82	744	13	5
86-87	1491	792	53	580	39	8
87-88	3394	2467	73	536	16	11
88-89	3202	2090	65	598	19	16
89-90	3137	2317	74	603	19	7
90-91	1958	1704	87	198	10	3
91-92	5141	4040	79	197	15	6
92-93	1928	1393	72	347	18	10
Μ.Ο. 8ετίας	3200	2403	75	550	17	8

Η ελαιοκομική περίοδος 90-91 εμφανίζει σημαντικά μειωμένη παραγωγή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν.

Η περίοδος 92-93 εμφανίζεται μειωμένη γιατί λείπουν στοιχεία από πολλά ελαιοτριβεία.

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω στοιχεία η μέση ετήσια παραγωγή ελαιολάδου ανέρχεται σε 3.200 τόννους με το 75% της παραγωγής προερχόμενο από την επαρχία Ρόδου και 17% από την επαρχία ΚΩ.Το υπόλοιπο 8% αποτελεί παραγωγή των υπολοίπων Νησιών κυρίως για αυτοκατανάλωση.

Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου γίνεται εντός των διοικητίκών ορίων του Ν. Δωδ/σου.Παρατίθεται κατάσταση ελαιοτριβείων Ν. Δωδ/σου.
Συσκευαστήριο-Τυποποιητήριο ελαιολάδου υπάρχει ένα στον Νομό πλήν όμως δεν λειτουργεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1992/1993

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΓΡΟΤΗΣ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	8120641	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΓΡΗΓ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ	ΑΠΟΛΛΩΝΑ	8140154	"
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΡΕΜΑΣΤΗ	8140014	"
ΥΙΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΚΙΚΑ	ΜΑΡΙΤΣΑ	8140022	"
ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ Ε-Κ. ΠΟΤΣΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	8140030	"
ΧΑΡΠΟΣ ΛΟΙΖΟΣ	ΜΑΡΙΤΣΑ	8140057	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΘΕΟΛΟΓΟΣ	8140065	"
ΚΑΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΘΕΟΛΟΓΟΣ	8140073	"
Α.Σ. ΣΟΡΩΝΗΣ	ΣΟΡΩΝΗ	8140081	"
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΑΛΑΚΟΣ	8140103	"
Α. Σ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ	ΚΡΗΤΗΝΙΑ	8140111	"
Α. Σ. ΕΜΠΩΝΑΣ	ΕΜΠΩΝΑ	8140120	"
Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ	ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ	8140138	"
Α. Σ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ	ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ	8140146	"
ΤΣΑΚΑΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΑΠΟΛΛΩΝΑ	8140162	"
ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	8140189	"
Αφοι ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ Ο.Ε.	ΑΦΑΝΤΟΥ	8140197	"
Α.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ	ΑΦΑΝΤΟΥ	8140200	"
Α.Σ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ	ΚΑΛΥΘΙΕΣ	8140219	
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛ. ΣΙΑ	ΚΑΛΥΘΙΕΣ	8140227	"
Α.Σ. ΨΙΝΘΟΥ	ΨΙΝΘΟΣ	8140235	"
ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΡΧΙΠΟΛΗ	8140243	"
Α.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	8140251	"
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΜΠ. ΟΕ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	8140260	"
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	8140278	"
ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	8140286	"
ΑΝΘΗ ΣΑΡΙΚΑ	" -ΜΑΛΩΝΑ	8140308	"
ΓΕΒΕΜ ΚΟΥΜΠΛΑΣ ΚΥΡ.	ΜΑΛΩΝΑ	8140316	"
ΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΑΣΣΑΡΙ	8140324	"
Α.Σ. ΛΑΕΡΜΩΝ	ΛΑΕΡΜΑ	8140332	"
Α.Σ. ΒΑΤΙΟΥ	ΒΑΤΙ	8140340	"
Α.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ	ΚΩΣ	8130353	"
ΥΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΟΕ	ΚΩΣ	8130361	"
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.	ΑΣΦΕΝΔΙ ΚΩ	8130370	"
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΣΦΕΝΔΙ ΚΩ	8130396	"
ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	8110425	"
ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΕΡΟΣ	8110433	"
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΕΡΟΣ	8110441	"
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ	ΑΠΕΡΙ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ	8120471	"
ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΝΕΤΩΝ	ΜΕΝΕΤΕΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ	8120501	"
ΣΑΒΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ	" - "	8120510	"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣΔ	8120528	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
Φ.Μ.Ο.ΠΥΛΩΝ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	8120536	"
ΕΚΚΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΩΝ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	8120544	"
ΜΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	8120560	"
ΑΣΠΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ	ΚΑΣΟΣ	8120587	"
Ν.ΠΑΝΑΗΣ-Κ.Χ"ΒΑΣΙΛΑΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	8140626	"
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΕΡΙ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ	8120633	"

Δ)ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Στίς μέρες μας τό σύνολο τών καλλιεργουμένων δένδρων ανέρχεται περίπου σε 2.329.221 από τά οποία η ποικιλία θρουμπούλια (Χονδρέλαια κατά τόν Σταματιάδη)καί Κορωνέικη (Κρητικιά κατά τόν Σταματιάδη) κατέχουν ποσοστά 75% καί 25% αντίστοιχα.Οι ποικιλίες Καλαμών, Μανάκι, Δαφνοελιά, καλλιεργούνται σε στατιστικά μή σημαντικό αριθμό.Αξίζει να σημειωθεί ότι η θρουμπολιά καί Κορωνέικη δέν είναι εντοπισμένες ανά περιοχές αλλά διάσπαρτες στό σύνολο τού Νομού.

Ε)ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Οι καλλιεργητικές τεχνικές δύνανται να ταξινομηθούν ως εξής:

α)Καταπολέμηση τού Δάκου:Γίνεται με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς στό 90% τών κοινοτήτων τού Νομού.Στό υπόλοιπο 10% γίνεται αλό θέρος. .Η δακοκτονία ενεργείται υπό τήν επίβλεψη της Δ/νσης Γεωργίας Νομού Δωδεκανήσου .

β)Ζιζανιοκτονία:Γίνεται μέ μηχανική κατεργασία τού εδάφους.

γ)Λίπανση :Γίνεται κατ΄έτος μέ επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα καί ανά τετραετία μέ σύνθετα ενσωματούμενα.

Ο Ελαιοκαρπος της θρουμπολιάς συλλέγεται κυρίως μέ ελαιοδίκτυα καί ελαιοσυλλεκτικά εδάφους.Η χρήση τών ελαιοδύκτων βαίνει αυξανόμενη ενώ η χρήση τών ελαιοσυλλεκτικών εδάφους δέν δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης τού παραγόμενου Ελαιολάδου καθ΄οτι τό σύνολο σχεδόν τού καρπού ελαιοποιείται σε φυγοκεντρικά Ελαιοτριβεία σε μικρές ποσότητες καί σέ σύντομα χρονικά διαστήματα από τήν συλλογή (1-2 ημέρες).

Στήν ποικιλία "Κορωνέικη"η συλλογή γίνεται κατά κύριο λόγο μέ μάδημα (χτένες)καί με ραβδισμό .

ΣΤ) ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τό κλίμα τού Νομού Δωδεκανήσου χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό ήπιο, τα μετεωρολογικά στοιχεία τού οποίου τήν τελευταία τετραετία ήταν τά κάτωθι:

Μέση Θερμοκρασία : 19,5 C

Σχετική Υγρασία : 59%

Βροχόπτωση : 700μμ/έτος

Ηλιοφάνεια : 264 ώρες/μήνα

Το έδαφος στο Νομό Δωδεκανήσου και ειδικώτερα στα Νησιά Ρόδο και Κω είναι Αργιλλοαμμώδες με ποσοστό άμμου αυξημένο στις παράκτιες περιοχές,χαλικώδες κατά μήκος των χειμμάρων,μέσης σύστασης έως πολύ γόνιμο κατά θέσεις.
(Στοιχεία Υ.Ε.Β. Δωδεκανήσου).

Ζ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταφορά τού Ελαιοκάρπου γίνεται μέ πλαστικά καφάσια διάτρητα ή μέ σάκκους από φυτικά υλικά (λινάτσες)των 30-50 KGR.Η αποθήκευση του καρπού πρό της Ελαιοποίησης δέν ξεπερνά τίς 1-2 ημέρες.Ο Ελαιόκαρπος συγκομίζετα ώριμος καί αυτό αφ'ενός μέν προσδίδει γλυκιά γεύση στό Ελαιόλαδο καί αφ' ετέρου η ελαιοπεριεκτικότητα ανέρχεται σέ υψηλά επίπεδα (θρουμπολιά 25-3(καί στή Κορωνέϊκη 20-25%-Καν. 2421/92 Ε.Ο.Κ.).Η σχέση σάρκας πυρήνα στή θρουμπολιά είναι 5 - 12/1 καί γιά την Κορωνέϊκη 4,8/1.Τό μέσο βάρος τού Ελαιοκάρπου στή θρουμπολιά ανέρχεται σε 2,5 -5 GR καί στή Κορωνέϊκη 1-1½1 GR (Ε.Μ. Σφακιώτακη; "Μαθήματα Ελαιοκομίας"Θεσσ/νίκη 1984).


Οι Ελαιοδεξαμενές της ΕΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ είναι συνολικής χωριτικότητας περίπου 1930 τόννων.(Η παραγωγή της Νήσου ΚΩ διατίθεται απ'ευθείας στό εμπόριο από τούς παραγωγούς).

Η επεξεργασία τού Ελαιοκάρπου όπως αυτό διαφαίνεται καί από τή κατάσταση Ελαιοτριβείων Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πού παρατίθεται, γίνεται στό σύνολό της σέ σύγχρονα φυγοκεντρικά Ελαιοτριβεία πού εδρεύουν εντός των Διοικητικών ορίων τού Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,εκθλίβεται καί σε θερμοκρασία μέχρι 32 C,

(θερμοκρασία Ελαιοζύμης).

Η)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τού Δωδ/νιακού Ελαιολάδου είναι συνυφασμένα τόσο μέ τήν ποικιλία της καλλιεργούμενης ελιάς (κατά κύριο λόγο θρουμπολιάς)τή σύσταση τού εδάφους καί τό μικροκλίμα τής περιοχής όσο καί μέ τόν τρόπο συγκομιδής καί κατεργασίας τού Ελαιοκάρπου.Συγκεκριμμένα τό Δωδ/κό Ελαιόλαδο, έχει ένα υποπράσινο έως κίτρινο-χρυσαφί χρωματισμό μέ γλυκιά γεύση καί γεύση ώριμου φρούτου ελιάς.Παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία αυθεντικών δειγμάτων Ελαιολάδου Γενικού Χημείου τού Κράτους .


ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΚΩΣ
ΤΗΛΟΣ
Αγ. Ιωάννης
Αγ. Ανδρέας
Πάνορμος
Μαλτεζάνα
Μετεωρολογικός Σταθμός
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αγ. Κωνσταντίνος
Λειβάδια
Αστυπάλαια
Αγ. Νικητήριον
Βλυχάδα
Μαρμάρι
Τηγκάκι
Ζήπάρι
Κέφαλος
Μεσσαριάς
Ιπποκράτους
Ιπποκράτειον
Ψαλίδι
Λαμπάδι
Λιμενάρια
Χαλκούσες
Δικαιοσύνη
Πυλί
Ζιά
Θολάρι
Αντιμάχεια
Αγ. Γεώργιος
Καρδάμαινα
Κεφάλος
Ζιά
Λάσσα
Πύλοι
Αγ. Παντελεήμων
Μεγάλο Χωριό
Σρονάκι
Λέσσα
Ασκληπιείο
Μανάδος
Ιπποκράτους Ασκληπιείον
Θολάρι


ΝΟΜΟΣ
Προσανατολιστικός Χάρτης 1:200.000
Όρια Μελετούμενης Περιοχής
ΕΠ. ΡΟΔΟΥ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΝ
Ακρ. Ζωνάρι
Παραδείσιον
Κρεμαστή
Ιαλυσός
Καρβούνας
Παστίδα
Λαγκάδα
Δαματρία
Θεολόγος
Μαριτσά
Σορωνή
Σπάνο Καλαμών
Φάναι
Καλαβάρδα
Καλυδιαί
Ψίνθος
Αράντου
Σαλακος
Αμπλιά
Ελεούσα
Αρχίπολις
Απολλώνα
Πλατάνια
Καλυμπια
Μονάστηρακον
Καμπικά
Αρχάγγελος
Μάδαρη
Καρακίου
Λάερμα
Αμ Ισίδωρος
Στάνα
Μονόλιθος
Πατριος
Προφήλια
Λάρδος
Μαργαρι
Λίνδος
Πύλων
Αγ. Αθανάσιος
Ακρ. Λάρδος (Φωκάς)
Ασκληπιείον
Απολακκία
Αρνίδα
Βάτιον
Γενναδίου
Μεσαναγρός
Καττάβια
Λαχανιά
Λατρος
Βίγλας
Ακρ. Αποβατικόν
Ακρ. Γενναδίου
Ακρ. Πλατύμαλα
Ακρ. Πρασονήσι
Ακρ. Στρογγύλη
Ν. ΜΑΚΡΥ
Κοπριά
Κρεμαστή
Ν. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Αναλυτικά στοιχεία δειγμάτων ελαιολάδου Νομού Δωδεκανήσου περιόδου 92-93.

Αριθμός δείγματος		4
Προέλευση		Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος, Μαλώνα - Μάσαρι
Ποικιλία		θρούμπες
Φύση Εδάφους		Πεδινό
Συγκομιδή		Ραβδισμός, Δίχτυα
Ωρίμανση		Πριν από την πλήρη ωρίμανση
Αποθήκευση		Σε τελλάρα
Τύπος ελαιοτριβείου		Φυγοκεντρικό
Ποσότητα από την οποία ελήφθη το δείγμα		2200 kg
Οξύτητα(% ελαϊκό οξύ)		0,95
K 270		0,20
K 232		2,16
ΔΚ		-
Αριθμ.Υπεροξειδίων(meq/kg		11,8
Μυριστικό οξύ	%	-
Παλμιτικό οξύ	%	10,9
Παλμιτελαϊκό οξύ	%	0,6
Δεκαεπτανοϊκό οξύ	%	<0,1
Δεκαεπτενοϊκό οξύ	%	<0,1
Στεατικό οξύ	%	2,3
Ελαϊκό οξύ	%	72,3
Λινελαϊκό οξύ	%	12,3
Λινολενικό οξύ	%	0,6
Αραχιδικό οξύ	%	0,4
Εικοσενοϊκό οξύ	%	0,3
Βεχενικό οξύ	%	0,1
Λιγνοκηρικό οξύ	%	<0,1
Αλειφατικές αλκοόλες(ppm)		159
Στερόλες	(ppm)	2517
Χοληστερόλη	%	<0,1
Βρασσικαστερόλη	%	-
24-Μεθυλενοχοληστερόλη	%	<0,1
Καμπεστερόλη	%	2,0
Καμπεστανόλη	%	0,1
Στιγμαστερόλη	%	0,5
Δ7-Καμπεστερόλη	%	0,2
Δ5,23-Στιγμασταδιενόλη	%	-
Χλεροστερόλη	%	0,6
β-Σιτοστερόλη	%	81,1
Σιτοστανόλη	%	-
Δ5-Αβεναστερόλη	%	11,7
Δ5,24-Στιγμασταδιενόλη	%	0,9
Δ7-Στιγμαστενόλη	%	0,9
Δ7-Αβεναστερόλη	%	1,8
β-Σιτοστερόλη(άθροισμα)	%	94,3
Ερυθροδιόλη	%	1,0
Ουβαόλη	%	0,1
Ερυθροδιόλη+Ουβαόλη	%	1,1
Τριλινολείνη	%	0,32
(ECN42)πειρ-(ECN42)θεωρ		0,09
Βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης		7,1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 3288/92, για την περίοδο εμπορίας 1992/93 ο ανωτέρω βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης προσαυξάνεται κατά 1,5.

Αριθμός δείγματος	7
Προέλευση	Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος, Παραδείσι
Ποικιλία	Κορωνέικες
Φύση Εδάφους	Ημιορεινό
Συγκομιδή	Ραβδισμός, Δίχτυα
Ωρίμανση	Πριν από την πλήρη ωρίμανση
Αποθήκευση	Σε σάκκους
Τύπος ελαιοτριβείου	Φυγοκεντρικό
Ποσότητα από την οποία ελήφθη το δείγμα	350 kg
Οξύτητα(%ελαϊκό οξύ)	0,30
K 270	0,15
K 232	1,93
ΔΚ	-
Αριθμ.Υπεροξειδίων(meq/kg	10,2
Μυριστικό οξύ %	-
Παλμιτικό οξύ %	12,3
Παλμιτελαϊκό οξύ %	0,8
Δεκαεπτανοϊκό οξύ %	<0,1
Δεκαεπτενοϊκό οξύ %	0,1
Στεατικό οξύ %	2,9
Ελαϊκό οξύ %	73,8
Λινελαϊκό οξύ %	8,7
Λινολενικό οξύ %	0,6
Αραχιδικό οξύ %	0,4
Εικοσενοϊκό οξύ %	0,2
Βεχενικό οξύ %	<0,1
Λιγνοκηρικό οξύ %	<0,1
Αλειφατικές αλκοόλες(ppm)	440
Στερόλες (ppm)	2185
Χοληστερόλη %	0,1
Βρασσικαστερόλη %	-
24-Μεθυλενοχοληστερόλη %	<0,1
Καμπεστερόλη %	2,4
Καμπεσταγόλη %	0,1
Στιγμαστερόλη %	0,5
Δ7-Καμπεστερόλη %	0,2
Δ5,23-Στιγμασταδιενόλη %	-
Χλεροστερόλη %	0,8
β-Σιτοστερόλη %	67,8
Σιτοστανόλη %	-
Δ5-Αβεναστερόλη %	26,3
Δ 24-Στιγμασταδιενόλη %	0,6
Δ7-Στιγμαστενόλη %	0,5
Δ7-Αβεναστερόλη %	0,6
β-Σιτοστερόλη(άθροισμα) %	95,5
Ερυθροδιόλη %	0,3
Ουβαόλη %	0,1
Ερυθροδιόλη+Ουβαόλη %	0,4
Τριλινολείνη %	0,18
(ECN42)πειρ-(ECN42)θεωρ	0,11
Βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης	5,1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 3288/92, για την περίοδο 1992/93 ο ανωτέρω βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης προσαυξάνεται κατά 1,5.

Χαρακτηριστικά δειγμάτων ελαιολάδου

Αριθμός δείγματος		10
Προέλευση		Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος, Άγιος Ισίδωρος
Ποικιλία		Κορωνέικες
Φύση Εδάφους		Ορεινό
Φυγοκομιδή		Ραβδισμός, Δίχτυα
Ωρίμανση		Πριν από την πλήρη ωρίμανση
Αποθήκευση		Σε σάκκους
Τύπος ελαιοτριβείου		Φυγοκεντρικό
Ποσότητα από την οποία ελήφθη το δείγμα		300 kg
Οξύτητα(% ελαϊκό οξύ)		0,31
K 270		0,18
K 232		2,00
ΔK		–
Αριθμ.Υπεροξειδίων(meq/kg		14,7
Μυριστικό οξύ	%	–
Παλμιτικό οξύ	%	12,3
Παλμιτελαϊκό οξύ	%	0,6
Μεκαεπτανοϊκό οξύ	%	<0,1
Μεκαεπτενοϊκό οξύ	%	<0,1
Στεατικό οξύ	%	2,9
Ελαϊκό οξύ	%	73,3
Λινελαϊκό οξύ	%	9,4
Λινολενικό οξύ	%	0,6
Αραχιδικό οξύ	%	0,4
Εικοσενοϊκό οξύ	%	0,2
Βηνενικό οξύ	%	0,1
Λιγνοκηρικό οξύ	%	<0,1
Αλειφατικές αλκοόλες(ppm)		221
Στερόλες	(ppm)	1990
Χοληστερόλη	%	0,1
Βρασσικαστερόλη	%	–
24-Μεθυλενοχοληστερόλη	%	<0,1
Καμπεστερόλη	%	2,9
Καμπεστανόλη	%	<0,1
Στιγμαστερόλη	%	0,4
Δ7-Καμπεστερόλη	%	0,2
Δ5,23-Στιγμασταδιενόλη	%	–
Χλεροστερόλη	%	0,9
Β-Σιτοστερόλη	%	61,9
Σιτοστανόλη	%	–
Δ5-Αβεναστερόλη	%	31,7
Δ5,24-Στιγμασταδιενόλη	%	0,8
Δ7-Στιγμαστενόλη	%	0,4
Δ7-Αβεναστερόλη	%	0,7
Β-Σιτοστερόλη(άθροισμα)	%	94,2
Ερυθροδιόλη	%	1,1
Ουβαόλη	%	0,1
Ερυθροδιόλη+Ουβαόλη	%	1,2
Τριλινολείνη	%	0,23
(ECN42)πειρ–(ECN42)θεωρ		0,11
Βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης		7,0

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 3288/92, για την περίοδο 1992/93 ο ανωτέρω βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης προσαυξάνεται κατά 1,5.

Αναλυτικά στοιχεία δειγμάτων ελαιολάδου Νομού Δωδεκανήσου περιόδου 92-93

Αριθμός δείγματος		8
Προέλευση		Ν. Δωδεκανήσου, Ρόδος, Απολακκιά
Ποικιλία		Κορωνέικες
Φύση Εδάφους		Πεδινό
Συγκομιδή		Ραβδισμός, Δίχτυα
Ωρίμανση		Πριν από την πλήρη ωρίμανση
Αποθήκευση		Σε σάκκους
Τύπος ελαιοτριβείου		Φυγοκεντρικό
Ποσότητα από την οποία ελήφθη το δείγμα		200 kg
Οξύτητα (% ελαϊκό οξύ)		0,29
K 270		0,14
K 232		1,77
ΔΚ		–
Αριθμ. Υπεροξειδίων (meq/kg		12,7
Μυριστικό οξύ	%	–
Παλμιτικό οξύ	%	11,5
Παλμιτελαϊκό οξύ	%	0,7
Δεκαεπτανοϊκό οξύ	%	<0,1
Δεκαεπτενοϊκό οξύ	%	<0,1
Στεατικό οξύ	%	2,7
Ελαϊκό οξύ	%	75,8
Λινελαϊκό οξύ	%	7,7
Λινολενικό οξύ	%	0,6
Αραχιδικό οξύ	%	0,4
Εικοσενοϊκό οξύ	%	0,2
Βεχενικό οξύ	%	0,1
Λιγνοκηρικό οξύ	%	<0,1
Αλειφατικές αλκοόλες (ppm)		269
Στερόλες	(ppm)	1718
Χοληστερόλη	%	0,1
Βρασσικαστερόλη	%	–
24-Μεθυλενοχοληστερόλη	%	0,1
Καμπεστερόλη	%	3,1
Καμπεστανόλη	%	0,2
Στιγμαστερόλη	%	0,5
Δ7-Καμπεστερόλη	%	0,1
Δ5,23-Στιγμασταδιενόλη	%	–
Χλεροστερόλη	%	0,8
β-Σιτοστερόλη	%	71,5
Σιτοστανόλη	%	0,4
Δ5-Αβεναστερόλη	%	21,5
Δ5,24-Στιγμασταδιενόλη	%	0,7
Δ7-Στιγμαστενόλη	%	0,5
Δ7-Αβεναστερόλη	%	0,5
β-Σιτοστερόλη (άθροισμα)	%	94,9
Ερυθροδιόλη	%	0,7
Ουβαόλη	%	<0,1
Ερυθροδιόλη+Ουβαόλη	%	0,7
Τριλινολείνη	%	0,16
(ECN42) πειρ-(ECN42) θεωρ		0,09
Βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης		7,8

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 3288/92, για την περίοδο 1992/93 ο ανωτέρω βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης προσαυξάνεται κατά 1,5.