Π.Ε.Ε.
13/4/93

23 Μαρτίου

Π Ρ Ο Σ

ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση Γεωργίας Σάμου
Σ Α Μ Ο Σ

632/150-ΟΥ

1508
13/4/93

Σας υποβάλλουμε συνημμένα αίτηση αναγνώρισης "Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης" Ελαιολάδου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
ΕΝΩΣΗ ΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΣΑΜΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ
Νομός 6085 1934

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ" ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΣΑΜΟΣ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Β)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γ)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Δ)ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Ε)ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΣΤ)ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ζ)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ - ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

-ΧΑΡΤΗΣ Ν.ΣΑΜΟΥ

-ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ

Α)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

-Επωνυμία: Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου Ε.Ο.Σ. Σάμου

-Διεύθυνση: Μαλαγάρι Σάμου
Σάμος 831 00

-Τηλέφωνο: (0273) 27381 - 27375

-FAX : (0273) 23907

-ΤΕΛΕΞ : 294 134 ΕΟΣΣ GR

-Νομική Μορφή Ε.Ο.Σ. Σάμου : Συν/σμός Περιορισμένης Ευθύνης

-Αριθμός Φυσικών μελών Οργάνωσης : 10.081
(υπάγονται όλοι οι ελαιοκαλλιεργητές του Ν.Σάμου)

-Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου Ε.Ο.Σ. Σάμου: Η Οργάνωση αναγνωρίστηκε το έτος 1986 (16 Σεπτεμβρίου - 3695/16-9-86 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας του Ν.Σάμου)

Β)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

- Γεωγραφικό Ονομα: ΣΑΜΟΣ / SAMOS

- Κατηγορία για την οποία ζητείται αναγνώριση: Προστατευομενη Γεωγραφική Ενδειξη.

Γ)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Τη Γεωγραφική ζώνη προέλευσης και μεταποίησης του ελαιοκάρπου αποτελούν τα διοικητικά όρια του Νομού Σάμου (συνημμένα χάρτης Ν.Σάμου κλίμακας 1:50.000) που περιλαμβάνει τις επαρχίες Σάμου και Ικαρίας.

Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην εν λόγω γεωγραφική ζώνη τη τελευταία θετία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. Ν.ΣΑΜΟΥ (τόννοι)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (τόννοι)	%	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (τόννοι)	%
85 - 86	4.221	3.541	83,9	680	16,1
86 - 87	2.058	1.840	89,4	218	10,6
87 - 88	3.886	3.303	85	583	15
88 - 89	1.591	1.421	89,3	170	10,7
89 - 90	4.215	3.581	84,9	634	15,1
90 - 91*	867	827	95,4	40	4,6
91 - 92	4.275	3.536	82,7	739	17,3
92 - 93 (προβ)	2.600	2.300	88,5	300	11,5

*Η Ελαιοκομική περίοδος 90 - 91 εμφανίζει σημαντικά μειωμένη παραγωγή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν.

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω στοιχεία, η μέση ετήσια παραγωγή ελαιολάδου ανέρχεται σε 3.264 τον. με 86,25% της παραγωγής προερχόμενο από την επαρχία Σάμου και 13,75% από την επαρχία Ικαρίας.

Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Ν.Σάμου. Παρατίθεται κατάσταση ελαιοτριβείων Ν.Σάμου ελαιοκομικής Περιόδου 1992-93.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ Ν. ΣΑΜΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1992-93

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α	ΕΔΡΑ	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ
8420025	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ Κ'ΣΙΑ ΟΕ	ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ	ΣΑΜΟΥ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8410372	ΚΑΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΑΦΝΗ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410380	ΣΕΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ Σ	ΔΑΦΝΗ	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΚΛΑΣΙΚΟ
8410402	ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410445	ΚΑΝΑΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΟΓΕΡΗ	ΦΡΑΝΤΑΤΟΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410453	ΚΑΛΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΡΑΝΤΑΤΟΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410461	ΠΟΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410470	ΣΚΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410488	ΕΜΠΟΡΙΚΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε.Η.ΠΛΟΥΤΗΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8410496	ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΚΛΑΣΙΚΟ
8410500	ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8410518	ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΕΛΗΣ ΟΕ	Κ.ΡΑΧΩΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8410550	ΚΟΥΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΚΛΑΣΙΚΟ
8410569	ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΝ	ΙΚΑΡΙΑΣ	"
8420017	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡ.Κ'ΥΙΟΣ ΟΕ	ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ	ΣΑΜΟΥ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8420033	ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ	ΣΑΜΟΥ	"
8420076	ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΜ. Κ'ΜΑΡΙΑ ΟΕ	ΒΑΘΥ	ΣΑΜΟΥ	"
8420092	ΣΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΣΙΑ Ο	ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	"
8420106	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΡΑΚΑΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	ΚΛΑΣΙΚΟ
8420130	ΙΩ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ'ΥΙΟΣ ΟΕ	ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΑΜΟΥ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8420149	ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΚΟΣΜΑΔΑΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	ΚΛΑΣΙΚΟ
8420157	Π.ΚΟΝΤΑΡΑΣ-Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΙΑ	ΠΥΡΓΟΣ	ΣΑΜΟΥ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8420165	ΑΓΡΟΤ.ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΓΩΝΔΑ	ΠΑΓΩΝΔΑΣ	ΣΑΜΟΥ	"
8420173	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ	ΠΑΓΩΝΔΑΣ	ΣΑΜΟΥ	"
8420203	Θ.Ε.ΣΚΟΥΤΑΣ-Γ.Π.ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ	Δ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ	ΣΑΜΟΥ	"
8420211	ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΣΙΑ	ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	"
8420220	Α.ΔΗΜΑΣ-Σ.ΚΑΛΑΤΖΗΣ-Σ.ΔΗΜΑ	ΜΥΛΟΙ	ΣΑΜΟΥ	"
8420246	ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
8420254	ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ	ΣΑΜΟΥ	"
8420262	Α.ΒΑΚΕΝΤΗΣ-Θ.ΒΑΚΕΝΤΗΣ Κ' Σ	ΧΩΡΑ	ΣΑΜΟΥ	"
8420270	ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ Κ.Κ' Γ. ΟΕ	ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ	ΣΑΜΟΥ	"
8420209	Σ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ Ι.ΒΑΚΕΝΤΗΣ	ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	"
8420300	ΣΥΝΕΤ.ΕΛΑΙΟΤΡ.ΟΙΝ.ΜΥΤΙΛΗΝ	ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ	ΣΑΜΟΥ	"
8420327	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ	ΣΑΜΟΥ	"
8420378	ΤΟΥΒΛΟΚΕΡΑΜ ΜΟΓΙΟΣ ΑΕ	Δ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ	ΣΑΜΟΥ	"

Δ)ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Η Ελαιοκαλλιέργεια στη Σάμο ανάγεται στους χρόνους της αρχαιότητας.Ο Αισχύλος ονομάζει το νησί ελαιόφυτο ο δε Αλεξις (Ε.Ι. Κρητικίδης:"Τοπογραφία αρχαία κ' σημερινή της Σάμου", Ερμούπολη, 1869) μνημονεύει το Σαμιώτικο Ελαιόλαδο ως κατωτέρω

...ουτοσί δε σοι
του λευκοτάτου πάντων ελαίου Σαμιακου
έστι μετρητής"

Ο Λούκιος Απουλήιος το 2 μ.Χ. αιώνα, αναφερόμενος στη γεωργία της Σάμου έγραφε:"... η γεωργία εν Σάμω περιορίζεται εν τη φυτεία και τη καλλιεργεία των ελαιών ων το προϊόν υπάρχει αυτόθι παντος άλλου καρπού αφθονώτερον".Κατά τον Σταματιάδη (Ε.Ι.Σταματιάδη "Σαμιακά" Σάμος 1881) οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς στη Σάμο κατατάσσονται σε: .... δαφνελαίας, χονδρελαίας, κρητικάς και τουρκοελαίας ...

Στις μέρες μας , το σύνολο των καλλιεργουμένων δενδρων ανέρχεται περίπου σε 1.800.000- από τα οποία η ποικιλία θρουμπολιά (χονδρελαία κατά τον Σταματιάδη) και Κορωνέικη (κρητικιά κατα τον Σταματιάδη) κατέχουν ποσοστά 90% και 10% αντίστοιχα.Οι ποικιλίες Καλαμών,Μανάκι, Δαφνοελιά καλλιεργούνται σε στατιστικά μη σημαντικό αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θρουμπολιά και Κορωνέϊκη δεν είναι εντοπισμένες ανά περιοχές αλλά διάσπαρτες στο σύνολο του Νομου.Λεπτομερή χαρακτηριστικά των ποικιλιών δίδονται σε συνημμένο φυλλάδιο (Ε.Μ. Σφακιωτακη "Μαθήματα Ελαιοκομίας" Θεσ/νίκη 1984).

Ε)ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ.

Οι καλλιεργητικές τεχνικές δύνανται να ταξινομηθούν ως εξής:

α)Καταπολέμηση του δάκου: Γίνεται μόνο με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς στο 70% των κοινοτήτων του Νομού. Στο υπόλοιπο 30% δεν γίνεται καταπολέμηση.Η δακοκτονία ενεργείται υπό την επίβλεψη της Δ/νσεως Γεωργίας Σάμου.

β)Ζιζανιοκτονία:Γίνεται με γεωργικά φάρμακα ενώ σε μικρό αριθμό ελαιώνων (κορωνέικη) εφαρμόζεται μηχανική κατεργασία του εδάφους.

γ)Λίπανση: Γίνεται κατ' έτος με επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα και ανά τετραετία με σύνθετα ενσωματούμενα.

Ο ελαιόκαρπος της θρουμπολιάς συλλέγεται κυρίας με ελαιοδίκτυα και ελαιοσυλλεκτικά εδάφους. Η χρήση των ελαιόδυχτων βαίνει αυξανόμενη ενώ η χρήση των ελαιοσυλλεκτικών εδάφους δεν δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης του παραγόμενου ελαιολάδου καθ'ότι το σύνολο σχεδόν του καρπού ελαιοποιείται σε φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία σε μικρές ποσότητες και σε σύντομα χρονικά διαστήματα από τη συλλογή.(1-2 ημέρες)
Στην ποικιλία "Κορωνέικη" η συλλογή γίνεται κατά κύριο λόγο με μάδημα (χτένες) και με ραβδισμό.

ΣΤ)ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το κλίμα του Ν.Σάμου χαρακτηρίζεται ως [illegible] τα μετεωρολογικά στοιχεία του οποίου η [illegible] κάτωθι:

Μέση θερμοκρασία: 17,5 C

Σχετική Υγρασία : 59%

Βροχόπτωση : 744 mm/έτος

Ηλιοφάνεια : 244 ώρες/μήνα

Το έδαφος στην μεν επαρχία Σάμου είναι ασβεστολιθικής κυρίως σύστασης, χαλικώδες μέτριας γονιμότητας στη δε επαρχία Ικαρίας είναι σχιστολιθικό-αμμοπηλώδες/χαλικώδες μετριας γονιμότητας.

Ζ)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ - ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με πλαστικά καφάσια διατρητα ή με σάκκους από φυτικά υλικά (λινάτσες) των 30-50 Kgr.Η αποθήκευση του καρπού προ της ελαιοποίησης δεν ξεπερνα τις 1-2 ημέρες.Ο ελαιόκαρπος συγκομίζεται ώριμος και αυτό αφ'ενός μεν προσδίδει γλυκιά γευση στο ελαιόλαδο και αφ'ετέρου η ελαιοπεριεκτικοτητα ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα (θρουμπολιά 25-30% και στη Κορωνέϊκη 20-25% - Καν. 2421/92 Ε.Ο.Κ.). Η σχέση σάρκας πυρήνα στη θρουμπολιά είναι 5 - 12/1 και για την κορωνέϊκη 4,8/1. Το μέσο βάρος του ελαιοκάρπου στη θρουμπολιά ανέρχεται σε 2,5 - 5 gr και στη Κορωνεικη 1-1,1 gr (Ε.Μ. Σφακιωτάκη: "Μαθήματα Ελαιοκομίας" Θεσ/νίκη 1984)

Οι ελαιοδεξαμενές της Ε.Ο.Σ. Σάμου είναι συνολικής χωρητικότητας περίπου 3.100 τόννων, ήτοι:

Μαλαγάρι	1000	τον.
Καρλόβασι	900	τον.
Παγώνδας	440	τον.

Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου, όπως αυτό διαφαίνεται και από τη κατάσταση ελαιοτριβείων Ν. Σάμου που παρατίθεται (στοιχειο Γ), γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε σύγχρονα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Σάμου.
Για την τυποποίηση των παραγομένων ελαιολάδων, σε όλο το Νομό,λειτουργεί από το 1992 μια μόνο Μονάδα Τυποποίησης ιδιοκτησίας Ε.Ο.Σ. Σάμου. Η μονάδα τυποποιεί εξαιρετικό Παρθενο Ελαιόλαδο και Παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασίες των 5 λίτρων.Είναι δυναμικότητας 6 τον./8ωρο και περιλαμβάνει:

-φίλτρο διαύγασης
-Φίλτρο στίλβωσης
-Μονάδα θέρμανσης
-Γεμιστικό (δοχεία 5 λίτρων)
-Τροφοδοτικό
-Κλειστικό
-Συσκευασία δοχείων
-Ανοξείδωτες δεξαμενές

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Σαμιώτικου Ελαιολάδου είναι συνυφασμένα τόσο με την ποικιλία της καλλιεργούμενης ελιάς κατά κύριο λόγο θρουμπολιάς) τη σύσταση του εδάφους και το μικροκλίμα της περιοχής όσο και με τον τρόπο συγκομιδής και κατεργασίας του ελαιοκάρπου. Συγκεκριμένα, το Σαμιώτικο ελαιόλαδο, έχει ένα κίτρινο-χρυσαφί χρωματισμό με γλυκιά γεύση και γεύση ώριμου φρούτου ελιάς. Παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία αυθεντικών δειγμάτων ελαιολάδου Χημικής Υπηρεσίας Ν.Σάμου.