ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
- ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
- ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

- ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- ΑΙΤΗΣΗ. Αγνώριση Π.Ο.Π . Αναλυτικά στοιχεία Αίτησης (Σελίδες 9)
- ΠΙΝΑΚΑΣ (I). Παραγωγή λαδιού ανά κοινότητα.
- ΠΙΝΑΚΑΣ (II). Κατάσταση Ελαιστριβείων.
- Εδαφολογικός χάρτης Νομού Ρεθύμνου
- ΠΙΝΑΚΑΣ (III). Μετεωρολογικός χάρτης επαρχίας Μυλοποτάμου.
- Εντυπο καταστατικού της Ε.Α.Σ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.
- Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης τυποποιητηρίου ελαιολάδου της Ε.Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
- Εντυπο άδειας λειτουργίας Τυποποιητηρίου.
- Χάρτες:
- 1) Νομού Ρεθύμνης.
- 2) Επαρχίας Μυλοποτάμου με οριοθέτηση τη ζώνη για την οποία ζητείται Π.Ο.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

✍ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ; ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

✍ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ; ΠΕΡΑΜΑ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)

✍ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ; (0834) 22214-22114

✍ ΦΑΞ ; 0834-22114

✍ ΤΕΛΕΞ ; 291377

✍ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ; ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . Η Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Μυλοποτάμου ιδρύθηκε το 1928. Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού με αριθμό 95/1030/ΜΕ/114 (επισυνάπτεται έντυπο με το νέο καταστατικό της Οργάνωσης)

✍

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

✍ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ; Βόρειος Μυλοπόταμος

✍ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ; "Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης "

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

✍ Την Γεωγραφική ζώνη προέλευσης και μεταποποίησης του ελαιοκάρπου αποτελούν : τα διοικητικά όρια της επαρχίας Μυλοποτάμου με νότιο όριο , νότια της παλιάς εθνικής οδού που συνδέει τις πόλεις του Ρεθύμνου και Ηρακλείου . Εντός των ορίων της εν λόγω ζώνης θα συμπεριληφθεί η πρωτεύουσα της επαρχίας Μυλοποτάμου (τό Πέραμα) στην οποία εδρεύει η Ενωση μας και βρίσκονται οι χώροι συγκέντρωσης και τυποποίησης του λαδιού . (Επισυνάπτουμε χάρτη της επαρχίας με σαφώς οριοθετημένη τη ζώνη προέλευσης και μεταποίησης του ελαιοκάρπου).

✍ Η παραγωγή του λαδιού στο Β. Μυλοπόταμο όπως φαίνεται από τους πίνακες I & II κυμαίνεται σταθερά πάνω από τους 1500 τόννους με τάση αύξησης .

✍ Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου γίνεται εντός των ορίων της Γεωγραφικής ζώνης σε σύγχρονα φυγοκεντρικά ελαιουργεία για τα οποία ο Πίνακας II δίδει στοιχεία δυναμικότητας , αριθμού παραγωγών και παραγωγής λαδιού ανά ελαιουργείο κατά την περίοδο 1985-1991.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ

✍ Η ελαιοκαλλιέργεια ξεκίνησε από την αρχαιότητα στην Κρήτη . Ο Β.Κριμπάς προσδιόρισε κατά τις ανασκαφές που έγιναν στην Φαιστό , μεταξύ των απόρων που του δόθηκαν από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και σπόρο ελιάς που χρονολογείται από την μεσομινωϊκή εποχή (1800-2000 π.χ.) . Σύμφωνα δε με τον Π.Αναγνωστόπουλο σε ανακοίνωση που έκανε στην Ακαδημία Αθηνών το 1951 και με βάση τα ευρήματα από ανασκαφές , πατρίδα της ελιάς είναι η Κρήτη.

✍ Σήμερα στην περιοχή έχουμε περίπου το 90% της καλλιεργούμενης ελιάς ποικιλίας κορωνέϊκη (ή ψιλολιά ή λιανολιά) και το υπόλοιπο 10% χονδρολιά. Η τάση των ελαιοκαλλιεργητών οδηγεί στη μείωση της χονδρολιάς και στην καθολική καλλιέργεια της κορωνέϊκης .

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Αποστάσεις Φύτευσης:

✍ Με εξαίρεση παλιές φυτεύσεις (10-15% των σήμερα καλλιεργουμένων δένδρων) οι αποστάσεις φύτευσης είναι (7-7.50 Χ 7μ)

Αρδευση

✍ Το 60% της κορωνέϊκης αρδεύεται στο Β.Μυλοπόταμο . Σαν μέσο άρδευσης χρησιμοποιείται (σχεδόν στο σύνολο της αρδευόμενης καλλιέργειας το σύστημα της στάγδην άρδευσης , ενώ ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών έχει προσαρμόσει στο σύστημα άρδευσης λιπαντήρα για ταυτόχρονη άρδευση και λίπανση .

Λιπανση:

✍ Η ποικιλία της κορωνέϊκης δεν παρουσιάζει έντονα το φαινόμενο της παρενιαφτοφορείας. Ιδίως στις περιπτώσεις των αρδευομένων φυτειών παρατηρείται κάθε χρόνο μιά καρποφορία από 50-80% . Η λίπανση (τύπος λιπάσματος - δοσολογία ανά δένδρο) προσαρμόζεται στην ηλικία , την παραγωγική κατάσταση και τις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων .

✍ Η ζωϊκή κοπριά (από πρόβατα εμπλουτίζει ανά 2-3 χρόνια το υπόστρωμα της ελαιοκαλλιέργειας . Ανά 2 αναπτυγμένα δένδρα προστίθεται 1 σακί κοπριάς (περίπου 50 κιλών) που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες εξαιτίας της αναπτυγμένης κτηνοτροφίας (κυρίως προβατοτροφίας) στην επαρχία μας.

✍ Από τα χημικά λιπάσματα χρησιμοποιούνται ανά 2 χρόνια τύποι σύνθετων λιπασμάτων σε ποσότητες 2-3 κιλά ανά αναπτυγμένο δένδρο , και ετησίως 1-2 κιλά αμμωνία (κυρίως ασβεστούχας μιά και τα εδάφη της περιοχής είναι κατά το μάλλον όξινα) .

✍ Σε αρκετές περιπτώσεις προστίθεται χωριστά Βόριο 200-250 gr ανά αναπτυγμένο δένδρο και κάθε τέσσερα χρόνια για διόρθωση εμφανιζομένων τροφοπενιών του στοιχείου.

✍ Σε ελαιώνες που διαθέτουν λιπαντήρα στο σύστημα άρδευσης προστίθεται 0,5 κιλό Νιτρικό Κάλι ανά δένδρο με την άρδευση σε δύο δόσεις , νωρίς το καλοκαίρι .

✍ Σε μικρότερη κλίμακα εφαρμόζονται διαφυλλικές λιπάνσεις με σκευάσματα αμινοξέων ή βοριούχα υγρά λιπάσματα . Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις της χρήσης ψυχανθών για χλωρή λίπανση .

ΚΛΑΔΕΜΑ:

✍ Τα δένδρα κρατούνται σε χαμηλό σχήμα κυπελοειδές . Ταυτόχρονα με την συγκομιδή οι βλαστοί του 2ου έτους που έχουν τη μεγάλη καρποφορία αφαιρούνται και αφήνονται οι λαιμαργοί που θα καρποφορήσουν την επόμενη χρονιά για να αφαιρεθούν κατά την συγκομιδή κ.ο.κ.

✍ Κλάδεμα ανανέωσης δεν απαιτείται γιατί με το κλάδεμα καρποφορίας που γίνεται κάθε χρόνο τα δένδρα δεν έχουν "γέρικους βραχίονες" . Εξαίρεση οι περιπτώσεις των προσβλημένων δένδρων από το βακτήριο "Pseudomonas Sevastanoi" που ανάλογα με την έκταση της προσβολής συνδιάζεται αυστηρό κλάδεμα με χρήση χαλκούχων σκευασμάτων για τον περιορισμό του .

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ:

✍ Στην μεγαλύτερη έκταση επιτυνχάνεται με μηχανική κατεργασία του εδάφους (νωρίς την Ανοιξη) ενώ από τα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται κυρίως τα επαφής μη διασυστηματικά (Paraquat , Diquat κτλ)

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

✍ *α) Χρήση χαλκούχων:* Γίνονται δύο εφαρμογές μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη των βροχών .

✍ *β) Καταπολέμηση τετρανύχου*Με την άνοδο των θερμοκρασιών (2ο-3ο δεκαήμερο του Απρίλη) θειάφισμα ή ψεκασμός με βρέξιμο θειάφι σε ελαιώνες με το πρόβλημα

✍ *γ) Καταπολέμηση του δάκου :* Γίνονται Δολοματικοί ψεκασμοί από εδάφους στο σύνολο της περιοχής του Β.Μυλοποτάμου με την καθοδήγηση της Δνσης Γεωργίας Ν.Ρεθύμνου και την ευθύνη του Ελαιοταμείου Ρεθύμνου.

✍ Μάλιστα έχει αρχίσει και επεκτείνεται γρήγορα η χρήση παγίδων (που συλλαμβάνουν ή στειρώνουν τα ακμαία) και ίσως τα επόμενα χρόνια να μειωθεί ο αριθμός και των δολοματικών επεμβάσεων .

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ:

✍ Η συλλογή γίνεται με μάδημα (χτένες) ή ράβδισμα με βέργες ή μηχανοκίνητα ραβδιστικά.

ΕΠΟΧΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:

✍ Από μέσα Δεκεμβρίου έως τα μέσα του Ιανουαρίου συλλέγεται ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής .

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μετεωρολογικά δεδομένα:

✍ Σύμφωνα με τον Πίνακα III που περιέχει τους μέσους όρους της οκταετίας 1966 - 1973 , το μέσο ετήσιο ύψο βροχής προσεγγίζει τα 700 mm . Συνολικά ο αριθμός των ημερών παγετού είναι 2,1 ημέρες ενώ οι μέσες και ακραίες τιμές της θερμοκρασίας ιδιαίτερα τον Χειμώνα εξασφαλίζουν διαφοροποίηση των καρποφόρων οφθαλμών και ικανοποιητική άνθηση .

✍ Γενικά το κλίμα μπορεί να χαρακτηριστεί εύκρατο μεσογειακό ξηρό καλοκαίρι και ήπιος χειμώνας . Οι άνεμοι γενικά είναι ασθενείς και λίγες μέρες μόνο του χρόνου νοτιάδες δημιουργούν προβλήματα σε άλλες καλλιέργειες (ξυνόδενδρα)

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ:

✍ Τα περισσότερα εδάφη ανήκουν από άποψη υφής στα μέσης σύστασης , "ερυθρές γαίες" προϊόντα αποσάθρωσης ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών πετρωμάτων .

✍ Από πλευράς οξύτητας συναντούμε ελαφρά όξινα εδάφη . Επισυνάπτουμε το σχετικό εδαφολογικό χάρτη .

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

✍ Από τα προαναφερθέντα (καλλιεργητική μέθοδος , τρόπος συλλογής και χρόνος συλλογής) αναμένεται ο καρπός να είναι ώριμος , απαλαγμένος από μικροοργανισμούς - σαπίσματα και φρέσκος . Σε μιά μέρα συλλογής ένα συνεργείο 3 ατόμων με μηχανοκίνητο ραβδιστικό μπορεί να συγκομίσει 10-15 σάκους των 40-50 kgr. Την ίδια μέρα σε κάθε εκμετάλευση συνήθως συνεργάζονται 2-3 νοικοκυριά-συνεργεία (συγγενών) και συνήθως την ίδια μέρα γίνεται η ελαιοποίηση του προϊόντος.Οι σάκοι μεταφοράς του ελαιοκάρπου που είναι από φυτικά υλικά και το βάρος ενός γεμάτου σάκου όπως προαναφέρθηκε είναι μεταξύ 40 και 50 κιλών . Επίσης η ύπαρξη καλού δικτύου αγροτικών δρόμων δίνει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς στα ελαιουργεία .

✍ Η περιεκτικότητα σε λάδι της ποικιλίας κορωνέϊκης μπορεί να φτάσει έως 27% . Το δένδρο φτάνει τα 5-7 μέτρα ύψος και τα φύλλα του είναι βαθυπράσινα μήκους 5,47...±...0,52 πλάτους 1,03...±....0,12 cm . Ο πυρήνας έχει σχήμα κυλιδροκωνικό με τη μία πλευρά κυρτωμένη , μέσο βάρος 0,17 gr . Ο καρπός έχει επίσης σχήμα κυλιδροκωνικό με μέσο βάρος 1,3 gr και φέρει πολύ μικρή θηλή . Η σχέση σάρκας προς πυρήνα καρπού είναι 6,6:1.

✍ Τα στοιχεία είναι παρμένα από την ελαιοκομία του Δρα Κ.Ποντίκη Καθηγητή Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

✍ Οι ελαιοδεξαμενές της Ε.Α.Σ.Μ είναι συνολικής χωρητικότητας 3.696 τόνων και βρίσκονται στο Πέραμα . Αναλυτικά : *3.200 τόννοι ιδιόκτητες-μεταλλικές στεγασμένες 400 τόννοι ιδιοκτησίας Υπουργείου Εμπορίου στεγασμένες 96 τόννοι στο υπόγειο του τυποποιητηρίου με επένδυση πλακάκια*

✍ Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε σύγχρονα φυγοκεντρικά εργοστάσια σε θερμοκρασίες κάτω των 32 βαθμών C για να διατηρεί το τελικό προϊόν τις πολύτιμες θρεπτικές του ιδιότητες .

✍ Για την τυποποίηση του παραγόμενου ελαιολάδου στην επαρχία υπάρχει μόνο μία μονάδα τυποποίησης (στο Πέραμα Μυλοποτάμου) που ανήκει στην Ε.Α.Σ.Μ.

✍ Η μονάδα τυποποίησης που επιχορηγήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Απόφαση 87.41 GR 063.0 Κανονισμός ΕΟΚ αριθμός 355/77 είναι δυναμικότητας 6 τόννων ανα θωρο.

✍ Τυποποιεί παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασίες των 5 λίτρων και περιλαμβάνει : Φίλτρο διάβγασης - Γεμιστικό (δοχείων 5 λίτρων) - Συσκευασία δοχείων - Φίλτρο στίλβωσης - Τροφοδοτικό - Μονάδα Θέρμανσης - Κλειστικό - Ανοξείδωτες δεξαμενές (3Χ10 τόννων) η μία μονωμένη

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

✍ Το λάδι που παράγεται στο Β.Μυλοπόταμο ποιοτικά βρίσκεται όπως όλα τα Κρητικά λάδιο σε υψηλή θέση . Οι θαυμάσιες κλιματολογικές συνθήκες (Πίνακας III) και εδαφολογική σύσταση (Χάρτης I) σε συνδυασμό με τις μεγάλες τιμές ηλιοφάνειας δίδουν τη δυνατότητα παραγωγής ενός γευστικότατου προϊόντος . Ταυτόχρονα η ύπαρξη σύγχρονων μεταποιητικών ελαιουργείων και κυρίως η γνώση και συνυδητοποίηση των παραγωγών ότι το ζητούμενο στο μέλλον είναι η ποιότητα έχουν σαν αποτέλεσμα ένα προϊόν με γλυκιά γεύση . Το χρώμα του είναι ιδιαίτερα ελκυστικό (κίτρινο - χρυσαφί) και κατά την κατανάλωση του δημιουργεί την φρουτώδη αίσθηση.

✍ Σε νεώτερο έγγραφο που θα στείλουμε θα εμφανίζουμε αναλυτικά στοιχεία χημικής ανάλυσης και μετρήσεων σε λάδι παραγωγής 1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΜΥΛ/ΜΟΥ Σελίδα No:001

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚ	ΛΑΔΙ 89/90	ΛΑΔΙ 90/91	ΛΑΔΙ 91/92
001	ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ Α	933101	268,079	231,793	412,030
002	ΑΓΙΑΣ Α	933102	49,677	92,315	111,695
003	ΑΧΛΑΔΕ Σ	933110	134,147	204,962	289,228
004	ΕΡΦΩΝ Η	933117	224,607	48,108	278,191
005	ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ	933125	146,970	153,396	267,647
006	ΠΑΝΟΡΜΟΥ	933128	83,565	115,442	166,223
007	ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	933130	115,144	101,870	186,844
008	ΠΡΙΝΟΥ	933132	128,768	85,108	208,954
009	ΡΟΥΜΕΛΗ	933133	104,568	169,198	194,316
010	ΣΙΣΩΝ-ΕΣ	933134	83,912	257,455	256,562
011	ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ	933135	39,800	77,157	106,596
012	ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ Α	933136	153,971	14,525	185,401
	ΣΥΝΟΛΑ		1,533,208	1,551,329	2,663,687

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Κατάσταση Ελαιοτριβείων Περιοχής Βορείου Μυλοποτάμου

						Παραγωγή Λαδιού ανά έτος						
Α/Α	Κωδικός	Επωνυμία	Εδρα	Ιπποδ.	Δυναμ	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1	9330127	Α.Σ.ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ	ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ	155.00	25600	285580	225331	215438	160210	244497	190964	161789
2	9330178	Α.Σ.ΑΧΛΑΔΕ	ΑΧΛΑΔΕ	91.00	15000	0	0	210333	104323	359575	213840	316149
3	9330208	Α.Σ.ΣΙΣΩΝ	ΣΙΣΕΣ	52.00	8000	73343	22102	95619	25870	99586	28437	169233
4	9330232	Α.Σ.ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ	ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ	120.00	21000	0	0	20747	284870	18781	159972	6108
5	9330267	ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΓΙΑ	25.00	14000	0	0	0	0	0	0	123338
6	9330020	ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΥΙΟΙ	ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ	45.00	13000	61085	183798	13115	179826	75236	231447	41975
7	9330062	ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΕΡΑΜΑ	82.00	12000	119023	89608	117790	94315	275391	369481	291996
8	9330011	ΚΑΛΑΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ	88.50	16000	133517	245217	74400	237405	174004	309190	0
9	9330046	ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ	107.00	12800	235792	275367	277383	251739	246844	233040	122921
10	9330100	ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ	ΣΙΣΕΣ	65.00	2000	137747	69299	118666	77004	156449	62813	160524
11	9330275	ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΥΔΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛ	ΠΕΡΑΜΑ	90.00	25000	0	0	0	0	0	0	216000
		Σύνολα				1046087	1110722	1143491	1415562	1650363	1799184	1610033

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ



ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

) Ανοικτόχροα χουμοανθρακικά εδάφη επί μαρνών (Ρεντζίνες)
) Σκοτεινόχρωμοι και ανοικτόχρωμοι ρεντζίνες αναμεμειγμένες με ερυθρογαίες
) Σκοτεινόχρωμοι και χαλικώδεις ρεντζίνες
) Ερυθρές γαίες και προϊόντα αποσαθρώσεως ασβεστολιθικών πετρωμάτων
) Αλλουβιακοί σχηματισμοί
) Ερυθρές γαίες και προϊόντα αποσαθρώσεως σχιστολιθικών πετρωμάτων
) Αποκλυσμένα άγονα εδάφη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Μετεωρολογικά στοιχεία Σταθμού Περάματος

Μέσοι όροι οκταετίας 1966 - 73

Μήνες	Θερμοκρασία αέρος					Σχετική υγρασία αέρος			Βροχή	Αριθμός	ημερών
	Μέση θερμοκρασία			Ακραία θερμοκ.							
	Μεγίστη	Ελαχίστη	Μέση	Μεγίστη	Ελαχίστη	Μεγίστη	Ελαχίστη	Μέση	Συν. ύψος m.m.	Παγετού	Βροχής
Ιαν.	12,63	5,84	9,23	18,86	1,5	90,6	50,4	72,5	174,3	0,6	13,1
Φεβ.	14,47	5,95	10,1	19,5	2,37	91,4	63,0	72,2	73,5	0,1	8,4
Μαρ.	15,15	6,49	10,82	23,62	1,62	89,8	48,1	69,0	121,1	1,0	9,7
Απρ.	18,72	7,99	13,35	31,75	2,75	94,2	48,8	71,5	35,4	0,2	5,1
Μάϊος	22,91	10,77	16,79	35	6,37	83,4	42,2	62,8	12,0		2,0
Ιούν.	27,51	14,15	20,84	36,85	9,62	86,5	49,7	67,4	4,6		0,9
Ιούλ.	27,24	16,5	21,88	36,12	12,0	80,9	45,3	63,1	0,9		0,2
Αύγ.	28,32	16,97	22,63	36,5	12,75	87,8	51,7	69,8	1,7		0,5
Σεπτ.	26,05	15,0	20,52	32,87	11,87	93,1	51,5	72,3	2,6		1,4
Οκτ.	22,19	12,65	17,41	30,5	8,87	94,0	55,1	74,5	121,2		7,6
Νοέμ.	18,78	9,8	14,3	25,86	4,86	93,3	56,1	74,7	66,2		6,4
Δεκέμ.	15,03	8,8	11,55	20,43	2,86	88,4	55,6	72,1	67,5	0,2	9,7

DGVI AGRICULTURE
01469 11.01.95 15:29
ORIGINAL
COPIE

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΔΡΑ: ΠΕΡΑΜΑ
ΤΗΛ. 22214

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

Α

26-10-94

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
422836 25.10.94
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Β. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

Οι αναφορές για την ύπαρξη της καλλιέργειας είναι τόσο παλιές που δικαιολογούν την σχέση του παραγωγού κατοίκου του Βορείου τμήματος του Μυλοποτάμου με το προϊόν.

Α. Στο 7ο αναπτυξιακό συνέδριο Μυλοποταμιτών όπως αναφέρεται στην εφημερίδα "Κρητική Επιθεώρηση" της 26/10/92 ο καθηγητής Μιχάλης Τρούλης παρουσίασε 2 βενετσιάνικα έγγραφα με βάση την μετάφραση του Δόκτωρος Ιστορίας Ιωάννη Γρυντάκη τα οποία αναφέρονται σε 2 χωριά του Βορείου Μυλοποτάμου (Μελιδόνι και Αγιά) και στα οποία γίνεται αναφορά στην ύπαρξη αριθμών ελαιοδένδρων (επισυνάπτονται αντίγραφα) σε ποσοστό δένδρων 23 και 25% αντίστοιχα.

Β. Από την εκδοση του Ε. Γενεράλη το 1879 με τίτλο "Τραγούδι της Κρήτης ή περιγραφή ταυτής" αναφέρεται ότι το κύριο προϊόν της περιοχής είναι το ελαιόλαδο "το κυριον εισόδημα είν' τα λαιόλαδα του" και για τον αριθμό των δένδρων αναφέρει "....η εποχία αυτή είναι πολύ μεγάλη, έχει και ελαιόδενδρα απού δεν τάχει άλλη".

Γ) Η παραγωγή εκλεκτού ελαιολάδου δημιούργησε και συνθήκες εμπορίας του προϊόντος. Έτσι από τον πρώτο εμποροβιομηχανικό οδηγό που εκδόθηκε το 1952 αναφέρονται: α) Τέσσερις έμποροι με έδρα το Πέραμα Μυλοποτάμου που ασχολούνται με την εμπορία λαδιού και άλλων προϊόντων. β) Η Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου για την οποία σε άλλο σημείο του Εμπορικού Οδηγού αναφέρονται στις εγκαταστάσεις ελαιοδεξαμενές (αύξονται ακόμα και η τότε χωρητικότητα τους υπολογίζεται στους 496 τόννους).

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.ΜΥΛ/ΜΟΥ
Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ:.....

Πέραμα 10 Οκτωβρίου 1994

Α

26-10-94

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Στον πίνακα που επισυνάπτουμε φαίνεται αναλυτική σύσταση δείγματος ελαιολάδου από την κοινότητα Σκεπαστή Μυλοποτάμου (κωδικός δείγματος ΡΕ02) ελαιοκομικής περιόδου 1993/94.

Οξύτητα, Κ 270, Κ 232, ΔΚ, Αριθμός Υπεροξειδίων:

Τα στοιχεία αυτά μαζί με την οργανοληπτική αξιολόγηση συνιστούν τα "κριτήρια ποιότητας" του παρθένου ελαιολάδου.

Οι παραπάνω δείκτες στο δείγμα της περιοχής φαίνονται ιδιαίτερα χαμηλοί σε σχέση με τα standars του Εμπορικού Προτύπου του Διεθνούς συμβουλίου ελαιολάδου. Το ευνοϊκό αυτό στοιχείο του προϊόντος στον τρόπο συλλογής του προϊόντος και επεξεργασίας του καρπού. Η συλλογή με ραβδισμό του ελαιοκάρπου και η συγκέντρωσή του σε σακκιά φυτικής προέλευσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 50 κιλών ανά σάκκο, η άμεση μεταφορά του (την ίδια μέρα) στο ελαιοτριβείο και η γρήγορη επεξεργασία του δίδουν το προϊόν με τα παραπάνω καλά χαρακτηριστικά. Καρποί οι οποίοι δεν συλλέγονται με ραβδισμό αλλά με δίκτυα τα οποία αδειάζονται κάθε 15-20 ημέρες σε σακκιά για να μεταφερθούν σε ελαιοτριβείο έχουν υψηλότερες τιμές στους παραπάνω δείκτες γιατί ο χρόνος από την αποκοπή του ελαιοκάρπου από το δέντρο ως την επεξεργασία είναι αντίστροφα ανάλογος με την ποιότητα.

Τιμές Τριλινελαϊνης και Στιγματοστερόλης:

Το μικρόκαρπο της ποικιλίας (στην περίπτωση μας ψιλολιά) είναι αυτό που δίδει πολύ χαμηλές τιμές
τριλινελαϊνης 0,05% (επιτρεπτό μέγιστο 0,5%) και
στιγματοστερόλης 0,1% (επιτρεπτό μέγιστο 0,5%)

Οργανοληπτική Αξιολόγηση:

Οι μεγάλες τιμές της πλειοφάνειας και το όξινο pH του εδάφους (που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής Β. Μυλ/που) είναι υπεύθυνα για το ιδιαίτερα ελκυστικό χρώμα του προϊόντος (κίτρινο - χρυσαφί) και την φρουτώδη αίσθηση που δίδει η γεύση του.

* Στην αναλυτική έκθεση επισυνάπτεται εδαφολογικός χάρτης της περιοχής και πίνακας μετεωρολογικών δεδομένων του Σταθμού Πέραματος.

Αλειφατικές Αλκοόλες:

Η γνώση των παραγωγών ότι οι υψηλές θερμοκρασίες παραγωγής λαδιού μειώνουν την ποιότητα του προϊόντος (και αυξάνουν επικίνδυνα τα ποσοστά των αλειφατικών αλκοολών) εξασφαλίζει την παραγωγή λαδιού με χαμηλό ποσοστό αλειφατικών αλκοολών όπως φαίνεται από τον πίνακα. Οι ίδιοι οι παραγωγοί επιβλέπουν την θερμοκρασία παραγωγής του λαδιού στο ελαιουργείο να μην υπερβαίνει τους 32 C (συνήθης θερμοκρασία παρ. 27 - 32 C)

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΜΥΛ/ΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΠΑΚΗΣ Γ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ